

LABORES DE

DICIEMBRE



PRADO

Mes muy caluroso, el pasto crece con más rapidez siempre que tenga agua disponible. Debe cortarse semanalmente y barrer los restos de hojas, aunque la máquina tenga capacho para prevenir pudriciones. Posterior al corte espolvoree el fungicida **PRADOSAN ANASAC JARDÍN**, no olvidando que antes debe horquetear el terreno para que exista un mejor aprovechamiento del producto.

Si no lo ha fertilizado, y este se encuentra amarillo, utilice **FERTIPRADOS PRIMAVERA - VERANO LENTA ENTREGA ANASAC JARDÍN**, que fertiliza durante 3 meses el pasto. No olvide controlar manualmente las malezas, antes que crezcan mucho.

Evite que florezca el trébol que se encuentra en las mezclas, para evitar que semille e invada todo el prado.

Elimine caracoles y babosas que frecuentan a Gramíneas y Dichondra sembradas en el jardín. Estos moluscos se alimentan de las hojas de estos prados, comúnmente se ven de noche en sectores más húmedos y sombríos. Para su control use **TOXIMOL ANASAC JARDÍN**, molusquicida que debe aplicarlo solamente de noche, esto evitará que las mascotas y niños estén expuestos a ingerir el producto.



ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

En árboles es importante eliminar el pasto que rodea la corona o cuello del árbol, ya que la humedad permanente reblandece la corteza y favorece la penetración de hongos, bacterias e insectos.

Controlar, pulgones, conchuelas y chanchito blanco con **INSECTICIDA ANASAC JARDÍN**, producto de baja toxicidad y alta eficacia. De esta forma, también evitamos la posterior invasión de Fumagina, consecuencia directa del jugo azucarado excretado por estos insectos chupadores. Si ya tenemos la infección de fumagina se recomienda aplicar **FUMAGINA ANASAC JARDÍN**.

Si compras árboles en bolsas, al plantarlos, retira con cuidado y trata de no romper el pan de tierra para evitar el estrés y la rotura de raíces. Aplica 250 gramos de **SUPERFOSFATO TRIPLE JARDITEC** en el hoyo de plantación y posteriormente, ubica el árbol, rellena con tierra de jardín mezclada con 1 parte de **TIERRA BIOLÓGICA COMPOST ANASAC JARDÍN** y 1 parte de **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**. Luego riega abundantemente.

En macizos arbustivos picar y soltar el suelo y añadir tierra de hoja mezclada con **TIERRA BIOLÓGICA COMPOST ANASAC JARDÍN** Y **GERMINAL ANASAC JARDÍN**.

Controlar los pulgones y cuncunas con **PULGONES ANASAC JARDÍN** o **CYPERKILL CASA Y JARDÍN ANASAC JARDÍN**. Para los gusanos del suelo se aplica **TERRASAN ANASAC JARDÍN** previo a mullir el suelo.

El calor hace que las diferentes especies de Verónicas florezcan en todo su esplendor, floración que es efímera, cuando la temperatura sobrepasa los 28°C. Hay infinidad de especies y variedades con flores moradas, azules, celestes, blancas e incluso rosadas. Para mantener los colores y crecimientos de las especies ornamentales, aplicar **GERMINAL ANASAC JARDÍN**.

Las Agatheas (Felicía amelloides), por efecto del calor inician el proceso de producción de semillas en varios lugares. En este momento se debe hacer una poda drástica eliminando las flores secas y capítulos con semilla, después se pulveriza con **NUTRISAC ANASAC JARDÍN** para volver a activar floración.

Podemos realizar esquejes de plantas arbustivas y herbáceas, utilizando **ENRAIZANTE ANASAC JARDÍN**. Luego de aplicado, se entierran en una jardinera, macetero o cajonera con **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**, este sustrato permite un mejor asentamiento y rápido establecimiento radicular. No olvidar que estos esquejes necesitan estar hidratados para poder enraizar.

Es tiempo de hacer almácigos de Portulaca, Salvia, Reina Luisa, Clavelina, Lobelia y muchas más. Éstos deben estar protegidos del sol directo, de aves y de animales.

Muchos bulbos de otoño-invierno inician su receso vegetativo, como “Lagrimas de Virgen”, Muscari, algunos Narcisos plantados tardíamente y las hojas se ponen amarillas y después desaparecen. Antes que esto ocurra se mulle el suelo, se fertilizan con **GERMINAL ANASAC JARDÍN**.

Si se extraen los bulbos de la tierra, se aconseja sumergirlos por 10 minutos en una solución de **CAPTAN ANASAC JARDÍN** (10 g. en 1 litro de agua), se secan, se envuelven en papel de periódico y se guardan en un lugar fresco y oscuro.

Muy interesante para este mes es la Begonia, tanto la tuberosa como la porcelana, son de semi-sombra calurosa. En las tuberosas se eligen aquellos dobles como las Camelias Híbridas de muchas corridas de pétalos. Es interesante destacar que esta especie sigue floreciendo hasta los primeros fríos, de modo que en lugares abrigados las flores pueden llegar hasta abril o mayo.



PLANTAS DE INTERIOR

Recomendamos asperjar las hojas tres veces a la semana con agua pura para brindarle a la planta una humedad ambiental que en la época de estival no tenemos en el interior de nuestra casa, siendo el aire caliente y seco. No olvide girar las plantas continuamente, así lograra que crezcan en forma más uniforme.

Abona con **PHYLLUM ANASAC JARDÍN**, fertilizante foliar compuesto de algas marina, excelente producto antiestrés; o **FERTPLANT ANASAC JARDÍN**, fertilizante a base de N-P-K más micronutrientes equilibrados que logra un buen desarrollo vegetativo.



CACTUS Y SUCULENTAS

Regula la cantidad de agua que le aplicas a las cactáceas, no se exceda en la cantidad, ya que éstas absorben la humedad ambiental de noche y las llevan a sus tejidos de reservas.

Para obtener una floración abundante es muy importante poner atención en el sustrato. Mejore el suelo con **HUMUS LOMBRISOL ANASAC JARDÍN**, 10 gramos por especie para maceteros de 15 cm, también procure que tenga un buen drenaje, para esto incorpore **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**.