



LABORES DE

SEPTIEMBRE



PRADO

Las temperaturas de septiembre comienzan a influir en el prado: se reinicia el crecimiento vegetativo, aumenta la demanda de agua y comienzan a aparecer malezas. Hasta la primera quincena de septiembre el corte se hace cada 10 días, luego la frecuencia aumenta a una vez por semana. El riego, 3 minutos por posición y hacia fin de mes 4 minutos. Si el suelo es muy arenoso, de infiltración rápida, se debe regar 3 veces al día y dando riegos largos cada 4 días. Es un mes excelente para renovar los prados, para esto recomendamos el uso de la semilla de prados **RESIEMBRA ANASAC JARDÍN**, este ryegrass posee una rápida germinación y se mantiene verde todo el año. También puede ocupar **PASTO FÁCIL ANASAC JARDÍN**, mezcla instantánea que viene lista para usar, contiene semillas (ryegrass), fertilizante de lenta entrega, sustrato y eco cristales ahorradores de agua.

Antes de resembrar es preferible regar hasta que salga la maleza, luego eliminarla por arranque y después sembrar.

Debido al aumento excesivo de temperatura es aconsejable aplicar a todo el pasto el producto **PRADOSAN ANASAC JARDÍN**, ya que este fungicida evita la aparición de las típicas manchas de color marrón que aparecen en el prado en épocas con temperaturas cálidas.



ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

Los árboles resistentes al frío y a las heladas tardías se pueden despertar con riego y posteriormente, con aplicaciones de **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOS ANASAC JARDÍN** como: Manzanos de Flor, Ciruelos de Flor, Liquidambar, Ailanthus, Zelkova, Celtis, Melia, Plátano Oriental, Árbol de Judea, Ginkgo, Tulipero, Alerce Europeo, Encinas de distintos tipos, Álamos, Sauces. Al mismo tiempo se deben controlar las cuncunas con algún producto específico, se aconseja **PULGONES ANASAC JARDÍN** o **CYPERKILL CASA Y JARDÍN ANASAC JARDÍN**, este producto es de baja toxicidad y muy eficiente para el control de esta plaga.

En cuanto termine la floración de las Azaleas, se hace un despunte suave redondeando la copa, se pulveriza con **CAPTAN ANASAC JARDÍN** y después de unos 15 días se recomienda utilizar el **FERTILIZANTE ESPECÍFICO FLORES Y PLANTAS ÁCIDAS ANASAC JARDÍN**. Y no olvidar aplicar mensualmente **SULFATO DE FIERRO JARDITEC** al riego.

En las rosas se recomienda aplicar **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA ROSAS ANASAC JARDÍN**. También se realiza aplicaciones preventivas de fungicida **AZUFRE ANASAC JARDÍN** para evitar el ataque de oídio (polvillo blanco). Cuando las hojas están dañadas por efecto del hongo, el azufre deberá reemplazarse por fungicida **OIDIO ANASAC JARDÍN**. También son susceptibles al contagio, de este hongo, los Evónimos, Dalias, Crespones, Hortensias, Parras y Salvias. En las variedades sensibles al oídio evite el salitre potásico, porque hace más tiernos los tejidos y la enfermedad se desarrolla mejor. Controlar los pulgones en rosas y otros arbustos, ya que éstos transmiten enfermedades virales. Aplicar el producto **INSECTICIDA JARDIN ANASAC JARDÍN**, pulverizando el follaje.

En los jardines comerciales están a la venta las siguientes plantas: Cartucho o Perrito, Cineraria, Petunia, Lobelia, Ranúnculo (tardío), Salvia, Verbena. Se plantan 12 a 16 plantas por metro cuadrado, idealmente de un sólo color, no entremezclados. El color debe manejarse con un sentido, excepto aquellas especies multicolores que es casi imposible hacer separación de colores como Linaria y Mimulus.

Llevar al terreno plantas como Dalia, Agapanto, Begonia Tuberosa. Se debe tener precaución en las noches frías y despejadas, ya que puede ocurrir una helada, de modo que conviene mojar el suelo y cubrirlas con papel de diario.

Lirios, Caña Ámbar y Achiras, que han estado muchos años en un mismo lugar, se sacan con horqueta y picota y se llevan a otro sitio. Algunos cubresuelos empiezan a crecer y otros comienzan a florecer. Colocar cebo para caracoles **TOXIMOL ANASAC JARDÍN**, evitando que mascotas y niños ingieran el producto.



HUERTO

Al aumentar las temperaturas, comienza la temporada de hacer almácigos de hortalizas de temporada, utilice **SUSTRATO HUERTO CASERO ANASAC JARDÍN**. Puede fertilizarlos con **BIOFERTILIZANTE HUERTO ANASAC JARDÍN**. Cuando tengas 3 a 4 hojas verdaderas se puede trasplantar al lugar definitivo. Mejorar la tierra del lugar de trasplante con **HUMUS LOMBRISOL ANASAC JARDÍN**.